

レジメン名: (30分)RAM/DOC 肺がん

【1コースの期間】

| | |
|----------|-----|
| インターバル日数 | 21日 |
|----------|-----|

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|--|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|--------|---------------|-----|-----|-------------------|
| 3 | サイラムザ(ラムシルマブ) | 10 | 10 | mg/Kg |
| 5 | ドセタキセル | 60 | 60 | mg/m ² |
| | | | | |
| | | | | |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day |
|------|------------------------------------|-------|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rp.1 | 生理食塩液 100mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 20 分 | 9:40 | | | | | | | |
| | デキサート 6.6mg | 1V | | | | | | | | | | | |
| | ポララミン 5mg | 1A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | 生理食塩液 250mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 30 分 | 10:00 | | | | | | | |
| | サイラムザ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.2又は0.22 μmのインライン フィルターを使用すること | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | 生理食塩液 50mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 5 分 | 10:30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | 生理食塩液 250mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 1 時間 | 10:35 | | | | | | | |
| | ドセタキセル | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | 生理食塩液 50mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 5 分 | 11:35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |

レジメン名: (60分)RAM/DOC 肺がん

[患者説明書](#) [はこちらをクリック](#)

【1コースの期間】

| | |
|----------|-----|
| インターバル日数 | 21日 |
|----------|-----|

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|--------|---------------|-----|-----|-------------------|
| 3 | サイラムザ(ラムシルマブ) | 10 | 10 | mg/Kg |
| 5 | ドセタキセル | 60 | 60 | mg/m ² |
| | | | | |
| | | | | |

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|--|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| Rp | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度(単位) | Day 1 | Day |
|------|--|-------|------|------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.1 | 生理食塩液 100mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 20分 | 9:40 | | | | | | | |
| | デキサート 6.6mg | 1V | | | | | | | | | | | |
| | ポラミン 5mg | 1A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | 生理食塩液 250mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 1時間 | 10:00 | | | | | | | |
| | サイラムザ | | | | | | | | | | | | |
| | ・忍容性良好であれば 2回目以降は30分に短縮可 ・必ず0.2または0.22のインライン フィルターを使用すること | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | 生理食塩液 50mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 5分 | 11:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | 生理食塩液 250mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 1時間 | 11:05 | | | | | | | |
| | ドセタキセル | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | 生理食塩液 50mL | 1本 | A側管 | 持続点滴 | 5分 | 12:05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |