

(初回)RAM/PAC 胃がん

患者説明書はここをクリック

インターバル日数	28日
----------	-----

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	サイラムザ(ラムシルマブ)	8	8	mg/Kg
4	パクリタキセル	80	80	mg/m ²

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンパッチ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00					
	デキサート 6.6mg	1V											
	ボラミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	10:30							
	サイラムザ												
	・忍容性良好であれば 2回目以降は30分に短縮可												
	・0.22 μ m以下のインラインフィルターを 使用すること												
Rp.3	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分			10:30					
	サイラムザ												
	・0.22 μ m以下のインラインフィルターを 使用すること												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:30		11:00					
Rp.5	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	11:35	10:30	11:05					
	バクリタキセル												
	0.22 μ m以下のインラインフィルターを 使用すること												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:35	11:30	12:05					
	バクリタキセル投与後の フラッシュ用												
Rp.7													

(2コース目以降)RAM/PAC 胃がん

[患者説明書はここをクリック](#)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	サイラムザ(ラムシルマブ)	8	8	mg/Kg
4	パクリタキセル	80	80	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00				
	デキサート 6.6mg	1V										
	ボラミン 5mg	1A										
	ガスター 20mg	1A										
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:30		10:30				
	サイラムザ											
	・0.22 μ m以下のインラインフィルターを使用すること											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:00		11:00				
Rp.4	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	11:05	10:30	11:05				
	パクリタキセル											
	0.22 μ m以下のインラインフィルターを使用すること											
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:05	11:30	12:05				
	パクリタキセル投与後のフラッシュ用											
Rp.6												