

【1コースの期間】

インターバル目数

28 日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ロンサーフ(トリフルリジン・チピラシル塩酸塩)
用法・用量	35mg/m ² /回 ・ 朝、夕食後の1日2回
投与スケジュール	5日間連続経口投与したのち2日間休薬。これを2回繰り返した後14日間休薬する。

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	サイラムザ(ラムシルマブ)	8	8	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00						
	ボラミン 5mg	1A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	10:30							
	サイラムザ												
	・忍容性良好であれば 2回目以降は30分に短縮可												
	・必ず0.2または0.22のインライン フィルターを使用すること												
Rp.3	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分		10:30						
	サイラムザ												
	必ず0.2または0.22 μ mのインライン フィルターを使用すること												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:30	11:00						
Rp.5													
Rp.5													
Rp.6													

