レジメン名： TMZ(内服)/BV(維持)(30分) 悪性神経膠腫

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テモゾロミド
用法・用量	1回 150mg/m^2～200mg/m^2、1日1回空腹時
投与スケジュール	Day1からDay5まで5日間連日内服し、その後23日間休薬する。

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブBS(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブBS		末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00						
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回投与時は90分かけて、問題無ければ2回目は60分、3回目以降は30分まで投与時間短縮可能。												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:30	10:30						
	フラッシュ用												
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名： TMZ(内服)/BV(維持)(90分) 悪性神経膠腫

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テモゾロミド
用法・用量	1回 150mg/m^2～200mg/m^2、1日1回空腹時
投与スケジュール	Day1からDay5まで5日間連日内服し、その後23日間休薬する。

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブBS(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブBS		末梢A	持続点滴	90 分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回投与時は90分かけて、問題無ければ2回目は60分、3回目以降は30分まで投与時間短縮可能。												
Rp.2	ベバシズマブBS		末梢A	持続点滴	60 分		10:00						
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回投与時は90分かけて、問題無ければ2回目は60分、3回目以降は30分まで投与時間短縮可能。												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:30	11:00						
	フラッシュ用												
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													