レジメン名： Zolbetuximab/XELOX(初回) 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ビロイ(ゾルベツキシマブ)	800	800	mg/㎡
5	オキサリプラチン	130	130	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カペシタビン
用法・用量	1000mg/m2/回　1日2回　朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服しその後1週間休薬する。

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:30							
	プレメディフラッシュ用												
Rp.3	ビロイ		末梢A	持続点滴	5 時間	10:35							
	生理食塩液 500mL	1本											
	投与開始から30～60分後までは100mg/m2/時で投与し、その後は200～400mg/m2/時で投与が可能。2.0mg/mL となるように生理食塩液												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	15:35							
	ビロイフラッシュ用												
Rp.5	オキサリプラチン		末梢A	持続点滴	2 時間	15:40							
	5% ブドウ糖液 500mL	1本											
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	17:40							
	オキサリプラチンフラッシュ用												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	注射用水 100mL	1本	指定なし	処置用		1回							
	ビロイ調製用												

レジメン名： Zolbetuximab/XELOX(2回目以降) 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ビロイ(ゾルベツキシマブ)	600	600	mg/㎡
5	オキサリプラチン	130	130	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カペシタビン
用法・用量	1000mg/m2/回　1日2回　朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服しその後1週間休薬する。

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:30							
	プレメディフラッシュ用												
Rp.3	ビロイ		末梢A	持続点滴	4.5 時間	10:35							
	生理食塩液 250mL	1本											
	投与開始から30～60分後までは75mg/m2/時で投与し、その後は150～300mg/m2/時で投与が可能。2.0mg/mLとなるように生理食塩液												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	15:05							
	ビロイフラッシュ用												
Rp.5	オキサリプラチン		末梢A	持続点滴	2 時間	15:10							
	5% ブドウ糖液 500mL	1本											
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	17:10							
	オキサリプラチンフラッシュ用												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	注射用水 100mL	1本	指定なし	処置用		1回							
	ビロイ調製用												