

抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間一覧(赤字は院内採用薬)

分類	No.	先発医薬品名	後発医薬品名	休薬期間
抗血小板薬	1	プラビックス	クロピドグレル	14日間
	2	エフィエント		
	3	コンプラビン配合錠	ロレアス配合錠 (クロピドグレル75mg/アスピリン100mg)	
	4	パナルジン	チクロピジン	10～14日間
	5	アスピリン	アスファネート ニトギス バファリン	7日間
			バッサミン バイアスピリン ファモター	
	6	キャブピリン配合錠		
	7	タケルダ配合錠		
	8	ブリリント		5日間
	9	プレタール	シロスタゾール	2日間
抗凝固薬	10	ワーファリン	ワルファリンK	5日間
	11	プラザキサ		
	12	エリキュース		3日間
	13	イグザレルト	リバーロキサバン	2日間
	14	リクシアナ		
EPA製剤	15	エパデール	イコサペント酸エチル	7～10日間
	16	ロトリガ	オメガ-3脂肪酸エチル	
冠血管拡張薬	17	ペルサンチン	ジピリダモール	2日間
	18	ロコルナール	トラピジル	1日間
	19	コメリアンコーワ	ジラゼブ	
プロスタグランジン製剤	20	ケアロードLA ドルナー プロサイリン ベラサスLA	ベラプロストNa	1日間
	21	オパルモン	リマプロスト	
その他	22	アンブラーグ	サルポグレラート	1日間

麻酔科術前外来受診患者、入退院支援センター対応患者について担当医より指示のない場合には、『抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間一覧』のうち、EPA製剤、冠血管拡張薬、プロスタグランジン製剤、その他の薬剤について、院内規程に沿って休薬するよう説明させていただくことがあります。