

術前・術後に休薬が必要な糖尿病治療薬(赤字は院内採用薬)

*手術当日及び絶食時は、インスリンを除く糖尿病治療薬は原則中止が必要となりますので、
ご注意ください。

No.	分類	一般名	先発医薬品名	後発医薬品名	休薬期間	
					術前	術後
1	ビグアナイド系薬 (配合剤も含む)	メトホルミン	グリコラン		2日間	—*
			メトグルコ	メトホルミン		
2		メトホルミン 配合剤	イニシンク配合錠 エクメット配合錠 メタクト配合錠 メトアナ配合錠			
3		ブホルミン		ブホルミン ジベトス ジベトンS		
4	テトラヒドロトリアジン系	イメグリミン	ツイミーグ			
5	SGLT2阻害薬 (配合剤も含む)	イブラグリフロジン	スーグラ		3日間	—*
6		ダバグリフロジン	フォシーガ			
7		ルセオグリフロジン	ルセフィ			
8		トホグリフロジン	デベルザ			
9		カナグリフロジン	カナグル			
10		エンパグリフロジン	ジャディアンス			
11		SGLT2阻害薬 配合剤	カナリア配合錠 スージャヌ配合錠 トラディアンス配合錠			

麻酔科術前外来受診患者、入退院支援センター対応患者について
担当医より指示のない場合には、『術前・術後に休薬が必要な糖尿病治療薬』の、院内規程に沿って休薬する
よう説明させていただくことがあります。

術前・術後に休薬が必要な糖尿病治療薬(赤字は院内採用薬)

*手術当日及び絶食時は、インスリンを除く糖尿病治療薬は原則中止が必要となりますので、
ご注意ください。

商品名	No
イニシンク配合錠	2
エクメット配合錠	2
カナグル	9
カナリア配合錠	11
グリコラン	1
ジベトス	3
ジベトンS	3
ジャディアンス	10
スーグラ	5
スージャヌ配合錠	11
ツイミーグ	4
デベルザ	8
トラディアンス配合錠	11
フォシーガ	6
ブホルミン	3
メタクト配合錠	2
メトアナ配合錠	2
メトグルコ	1
ルセフィ	7

備考：
添付文書、文献などを参考に、内分泌科と合意の上、対象薬剤、休薬期間を設定している。
記載対象は、薬価収載薬剤と経過措置より5年以内の薬剤とし、経過措置より5年以内の
薬剤は※印を付している。経過措置薬はSAFE-DIの情報を元に抽出している。

2017年3月1日：第1版作成
商品名は2017年3月1日付で薬価収載されているものを登録。
2018年11月09日：第2版作成
カナリア、スージャヌ、メトアナ、トラディアンスを追加。
2020年4月13日：第3版作成
備考欄の記載を修正、経過措置医薬品について修正
2021年3月12日：第4版作成
経過措置医薬品について情報更新
2023年3月8日：第5版作成
ネルビス、メデット、アブルウェイを削除。ツイミーグ、ブホルミンを追加。
2024年8月31日：第6版作成
SGLT2阻害薬の休薬期間を3日間に変更。

「麻酔科術前外来受診患者、入退院支援センター対応患者について
担当医より指示のない場合には、『術前・術後に休薬が必要な糖尿病治療薬』の、院内規程に沿って休薬する
よう説明させていただくことがあります。」を追記。
2024年12月24日：第7版作成
術前・術後の記載変更