


# ～Zolbetuximab（ビロイ®）の投与速度と悪心・嘔吐時の対応～


## 室温で希釈後12時間以内に投与を完了すること！

冷所保管により希釈後24時間まで安定性が保たれるため、受け取り後すぐに投与開始できない場合は、冷蔵庫で保管する。  
(室温で12時間以内に投与完了できなかった場合はビロイ®は基本的に残薬破棄で対応する)

### ○投与速度（流速は各表参照）



### ※ビロイ®投与中の悪心・嘔吐時の対応は制吐薬投与ではなく投与中断が1stです！！




### ●初回（800mg/m<sup>2</sup>：共通）

| 速度①         | 速度②          | 速度③          | 速度④          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 75<br>mL/hr | 150<br>mL/hr | 225<br>mL/hr | 300<br>mL/hr |

### ※3 投与中断後30分経過しても悪心・嘔吐がGrade1以下に回復しない場合の対処方法

- ① 医師より指示があれば従う
- ② プリンペラン注10mg 1A 1ショット静注（ビロイ投与中2回まで）
- ③ アトラックスP注25mg 1A + 生食50mL 15分点滴静注（ビロイ投与中1回まで）
- ④ セレネース注5mg 0.5A + 生食50mL 15分点滴静注（ビロイ投与中1回まで）

①～④のいずれかで対応後15分経過観察を行い悪心・嘔吐がGrade1以下に回復した場合は1段階減速して再開する。  
回復しない場合には医師へ報告した上で指示を受ける。



### ●2回目以降（600mg/m<sup>2</sup>：3週間毎）

| 速度①         | 速度②          | 速度③          | 速度④          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 60<br>mL/hr | 120<br>mL/hr | 180<br>mL/hr | 240<br>mL/hr |

### ●2回目以降（400mg/m<sup>2</sup>：2週間毎）

| 速度①         | 速度②         | 速度③          | 速度④          |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 40<br>mL/hr | 80<br>mL/hr | 120<br>mL/hr | 160<br>mL/hr |

※次回以降に外来治療へ移行する際は、③または④の速度まで流速が上げられた場合に限るため、最終的な投与速度①～④を必ずカルテに記載すること！

\*何かご不明な点がございましたら、薬剤部  
無菌室（8464）へ問い合わせください。

東京医療センター 薬剤部

2024年7月作成

2025年9月改訂ver3

参考：アステラス製薬HP

