レジメン名：　BV/TC 卵巣がん（180/AUC＝6）

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	パクリタキセル	180	180	mg/㎡
4	カルボプラチン	AUC 6	900mg	
5	アバスチン(ベバシズマブ)	15	15	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	2V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	ポララミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	パクリタキセルの60分前に開始												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:30							
	アロカリス 235mg	1V											
	パクリタキセルの30分前に開始												
Rp.3	パクリタキセル		末梢A	持続点滴	3 時間	11:00							
	生理食塩液 500mL	1本											
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること												
Rp.4	カルボプラチン		末梢A	持続点滴	1 時間	14:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.5	アバスチン		末梢A	持続点滴	90 分	15:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回90分で投与、問題なければ2回目以降は60分、それ以降は30分で投与可能												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	16:30							
	フラッシュ用												