

レジメン名: PLD/CBDCA 卵巣がん

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドキシル(ドキソルビシン)	30	30	mg/m <sup>2</sup>
4	カルボプラチン	AUC 5	750mg	

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	アロカリス 235mg	1本	指定なし	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 1.65mg	2A											
	グラニセロンバッグ 3mg/50ml	1本											
Rp.2	ドキシル	1本	指定なし	持続点滴	60分	10:30							
	5%ブドウ糖液 250mL												
	フィルターは使用しないこと。												
Rp.3	5%ブドウ糖液 50mL	1本	指定なし	持続点滴	15分	11:30							
	ドキシルと同速度または260mL/hで投与。												
Rp.4	カルボプラチン	1本	指定なし	持続点滴	60分	11:45							
	生理食塩液 250mL												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	カルボプラチン終了後フラッシュ用												
Rp.6													