

レジメン名: 【1コース目】Amiva/Lazertinib (80kg未満)

【1コースの期間】

| | |
|----------|----|
| インターバル日数 | 28 |
|----------|----|

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---------|----------|-----|------|---------|
| 6,7,8,9 | アミバンタマブ | 350 | 1050 | mg/body |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|----------------|
| 商品名(一般名) | ラズクルーズ(ラゼルチニブ) |
| 用法・用量 | 1回240mg 1日1回 |
| 投与スケジュール | 連日 |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度(単位) | Day 1 | Day 2 | Day 8 | Day 15 | Day 22 | Day | Day | Day |
|------|----------------------|--------------|------|------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Rp.1 | デキサート 6.6mg | 6.6mg | 末梢A | 持続点滴 | 30分 | 10:00 | 10:00 | | | | | | |
| | デキサート 1.65mg | 3.3mg | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 50mL | 50mL | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | ポララミン 5mg | 5mg | 末梢A | 持続点滴 | 15分 | 10:30 | 10:30 | | | | | | |
| | ガスター 20mg | 20mg | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 50mL | 50mL | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | ポララミン 5mg | 5mg | 末梢A | 持続点滴 | 15分 | | | 10:00 | 10:00 | 10:00 | | | |
| | 生理食塩液 50mL | 50mL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | 生理食塩液 50mL | 50mL | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 10:45 | 10:45 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | アセリオバック 1000mg/100mL | 1000mg/100mL | 末梢A | 持続点滴 | 15分 | 10:50 | 10:50 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | 生理食塩液 50mL | 50mL | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 11:05 | 11:05 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day 2 | Day 8 | Day 15 | Day | Day | Day | Day |
|-------|--|-------------|------|------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|
| Rp.7 | ライブリバント | 350mg/body | 末梢A | 持続点滴 | 50~75 mL/h | 11:10 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 250mL | 250mL | | | | | | | | | | | |
| | <small>・0.22 μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 最終投与量は総量250mLに調製する。 ・50mL/hで開始し、投与開始2時間後にinfusion reactionが認められなければ場合は、75mL/hへ速度をあげられる。</small> | | | | | | | | | | | | |
| Rp.8 | ライブリバント | 700mg/body | 末梢A | 持続点滴 | 50~75 mL/h | | 11:10 | | | | | | |
| | 生理食塩液 250mL | 250mL | | | | | | | | | | | |
| | <small>・0.22 μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 最終投与量は総量250mLに調製する。 ・50mL/hで開始し、投与開始2時間後にinfusion reactionが認められなければ場合は、75mL/hへ速度をあげられる。</small> | | | | | | | | | | | | |
| Rp.9 | ライブリバント | 1050mg/body | 末梢A | 持続点滴 | 85 mL/h | | | 10:40 | | | | | |
| | 生理食塩液 250mL | 250mL | | | | | | | | | | | |
| | <small>・0.22 μmのインラインフィルター付きルートを用いること。</small> | | | | | | | | | | | | |
| Rp.10 | ライブリバント | 1050mg/body | 末梢A | 持続点滴 | 125 mL/h | | | | 10:40 | 10:40 | | | |
| | 生理食塩液 250mL | 250mL | | | | | | | | | | | |
| | <small>・0.22 μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 ・最終投与量は総量250mLに調製する。</small> | | | | | | | | | | | | |
| Rp.11 | 生理食塩液 50mL | 50mL | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 15:10 | 15:10 | 13:40 | 12:40 | 12:40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

レジメン名: 【2コース目以降】Amiva/Lazertinib (80kg未満)

【1コースの期間】

| | |
|----------|----|
| インターバル日数 | 28 |
|----------|----|

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|----------------|
| 商品名(一般名) | ラズクルーズ(ラゼルチニブ) |
| 用法・用量 | 1回240mg 1日1回 |
| 投与スケジュール | 連日 |

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|--------|----------|------|------|---------|
| 5 | アミバンタマブ | 1050 | 1050 | mg/body |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day 15 | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|------|---|--------------|------|------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rp.1 | ポララミン 5mg | 5mg | 末梢A | 持続点滴 | 15分 | 10:00 | 10:00 | | | | | | |
| | 生理食塩液 50mL | 50mL | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | 生理食塩液 50mL | 50mL | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 10:15 | 10:15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | アセリオバック 1000mg/100mL | 1000mg/100mL | 末梢A | 持続点滴 | 15分 | 10:20 | 10:20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | 生理食塩液 50mL | 50mL | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 10:35 | 10:35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | ライプリバント | 1050mg/body | 末梢A | 持続点滴 | 125 mL/h | 10:40 | 10:40 | | | | | | |
| | 生理食塩液 250mL | 250mL | | | | | | | | | | | |
| | <small>・0.22μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 ・最終投与量は総量250mLに調製する。</small> | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | 生理食塩液 50mL | 50mL | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 12:40 | 12:40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |