レジメン名：　【1サイクル目】BelaPd

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ポマリドミド
用法・用量	4mg/日
投与スケジュール	Day1～21内服 ※レナデックス錠　40mg/日をDay1,8,15,22に内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ブーレンレップ（ベランタマブ マホドチン）	2.5	2.5	mg/kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day 11	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ブーレンレップ		末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液250mL	1本											
	注射用蒸留水20mL	1A											
	2～8℃で24時間保存可												
	(～25℃なら6時間以内に投与を完了)												
Rp.2	生理食塩液50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:30							
	フラッシュ用												
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名：　【2サイクル目以降】BelaPd

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ポマリドミド
用法・用量	4mg/日
投与スケジュール	Day1～21内服 ※レナデックス錠　40mg/日をDay1,8,15,22に内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ブーレンレップ（ベランタマブ マホドチン）	1.9	1.9	mg/kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day 11	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ブーレンレップ		末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液250mL	1本											
	注射用蒸留水20mL	1A											
	2～8℃で24時間保存可												
	(～25℃なら6時間以内に投与を完了)												
Rp.2	生理食塩液50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:30							
	フラッシュ用												
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													