レジメン名：　【漸増用量1】Teclistamab

【1コースの期間】

インターバル日数	2日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	テクベイリ(テクリスタマブ)	0.06	0.06	mg/kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	テクベイリ皮下注30mg ・腹部または大腿に投与 ・同一部位への反復投与は行わないこと ・テクベイリ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること ・1シリンジの薬液量は2mLを超えないこと。(2mL以上投与の場合は複数シリンジに均等に			皮下注射		1回							
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名：　【漸増用量2】Teclistamab

【1コースの期間】

インターバル日数	2日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	テクベイリ(テクリスタマブ)	0.3	0.3	mg/kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	テクベイリ皮下注30mg ・腹部または大腿に投与 ・同一部位への反復投与は行わないこと ・テクベイリ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること ・1シリンジの薬液量は2mLを超えないこと。(2mL以上投与の場合は複数シリンジに均等に			皮下注射		1回							
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名：　【治療用量】Teclistamab

【1コースの期間】

インターバル日数	7日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	テクベイリ(テクリスタマブ)	1.5	1.5	mg/kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	テクベイリ皮下注153mg ・腹部または大腿に投与 ・同一部位への反復投与は行わないこと ・治療用量初回投与時はテクベイリ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること ・1シリンジの薬液量は2mLを超えないこと。(2mL以上投与の場合は複数シリンジに均等に分割)			皮下注射		1回							
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													