

抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間一覧(赤字は院内採用薬)

分類	No.	先発医薬品名	後発医薬品名	休薬期間
				術前
抗血小板薬	1	プラビックス	クロピドグレル	7日間
	2	エフィエント	プラスグレル	
	3	コンプラビン配合錠	ロレアス配合錠 (クロピドグレル75mg/アスピリン100mg)	
	4	パナルジン	チクロピジン	7日間
	5	アスピリン	アスファネート ニトギス バファリン※ バッサミン バイアスピリン ファモター	なし ※主治医が休薬を必要と判断した場合はカルテに休薬期間を記載する。
	6	キャブピリン配合錠		
	7	タケルダ配合錠		
	8	ブリリント		5日間
	9	プレタール	シロスタゾール	2日間
抗凝固薬	10	ワーファリン	ワルファリンK	5日間
	11	プラザキサ		2日間 ※腎機能障害患者 (Ccr<30mL/min) では 休薬期間の延長(72時間) を考慮する。
	12	エリキュース		
	13	イグザレルト	リバーロキサバン	
	14	リクシアナ		
EPA製剤	15	エパデール	イコサペント酸エチル	7日間
	16	ロトリガ	オメガ-3脂肪酸エチル	
冠血管拡張薬	17	ペルサンチン	ジピリダモール	2日間
	18	ロコルナール	トラピジル	2日間
	19	コメリアンコーワ	ジラゼブ	1日間
プロスタグランジン製剤	20	ケアロードLA ドルナー プロサイリン ベラサスLA	ベラプロストNa	1日間
	21	オパルモン	リマプロスト	
その他	22	アンブラーグ	サルポグレラート	1日間

麻酔科術前外来受診患者、入退院支援センター対応患者について担当医より指示のない場合には、『抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間一覧』のうち、EPA製剤、冠血管拡張薬、プロスタグランジン製剤、その他の薬剤について、院内規程に沿って休薬するよう説明させていただくことがあります。